



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2020

м. КИЇВ

№ 297

Про внесення змін до наказу
Міністерства оборони України
від 09 грудня 2015 року № 703

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України

"11" вересня 2020 року

за № 877/35160

Відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446, Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 04 листопада 2016 року № 591, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1538/29668, з метою поліпшення якості та ефективності санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів військової служби, ветеранів війни та деяких інших категорій осіб і членів їхніх сімей

наказую:

000084 *

3.177-2020

1. Внести зміни до Переліку медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1681/28126, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до Переліку медичних показань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1682/28127, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Переліку медичних протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1683/28128, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України



Андрій ТАРАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства оборони України
 09 грудня 2015 року № 703
 (у редакції наказу Міністерства оборони України
 27 серпня 2020 року № 297)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
 в Міністерстві юстиції України
 "11" вересня 2020 року
 за № 844/35460

ПЕРЕЛІК

медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України

№ з/п	Код за МКХ-10	Стани та захворювання	Показання до санаторно-курортного лікування	Протипоказання до санаторно-курортного лікування	Профільний санаторій						
					ЦМР та СЛ "Пуша-Водиця"	ЦВКС "Хмільник"	ЦМР та СЛ "Трускавецький"	ЦМР та СЛ "Одеський"	ЦВБС "Приморський"	Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону	Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби									
2	B 15, B 16	Реконвалесценти гострих вірусних гепатитів A та B	Реконвалесценти гострих вірусних гепатитів A та B – за умови відсутності активності або з мінімальними ознаками запального процесу в печінці	Активна стадія гострого гепатиту A або гострого гепатиту B			+			+	
3	B18.0, B18.1, B18.2	Хронічні вірусні гепатити B та C	Хронічний вірусний гепатит B та хронічний вірусний гепатит C за відсутності активності або з мінімальними ознаками запального процесу в печінці	Стадії помірної та виразної активності, наявність помірної та виразного фіброзу з портوپортальними септами, цироз печінки			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	IV	Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин									
5	E 10	Цукровий діабет інсулінозалежний	Цукровий діабет I типу легкої середньотяжкої форм	Цукровий діабет тяжкої форми. Виразна декомпенсація діабету з кетоацидозом, лабільний перебіг, виражені стадії макро- та мікроангіопатій, нейропатії, недостатність периферичного, церебрального чи коронарного кровообігу			+	+			
6	E 11	Цукровий діабет інсулінонезалежний	Цукровий діабет II типу легкої форми. Порушення толерантності до глюкози	Цукровий середньотяжкої та тяжкої форм		+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Цукровий діабет II типу (від переважання резистентності до інсуліну з відносною інсуліновою недостатністю до переважання секреторного дефекту з резистентністю до інсуліну або без неї) у середньотяжкій формі, у стані компенсації. Порушення толерантності до глюкози	Виразна декомпенсація діабету з кетоацидозом, лабільний перебіг, виражені стадії макро- та мікроангіопатій, нейропатії, недостатність периферійного, церебрального чи коронарного кровообігу. Органічні розлади та артропатії			+			+	
7	E 66.0	Ожиріння та інші види надмірного харчування	Аліментарно-конституційне ожиріння I – II ступенів	Ожиріння III – IV ступенів		+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Аліментарно-конституційне ожиріння III ступеня з помірно вираженими ускладненнями та супутніми захворюваннями на тлі ефективного консервативного лікування	Ожиріння III – IV ступенів з тяжкими ускладненнями та супутніми захворюваннями, у випадках неефективності консервативного лікування або за наявності серцевої недостатності II стадії і вище			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	V	Психічні розлади і порушення поведінки									
9	F 43.1	Посттравматичний стресовий розлад (далі – ПТСР)	Посттравматичний стресовий розлад легкого ступеня (прояви надмірної дратівливості, замкненості, втрати апетиту, головного болю, швидкої стомлюваності) – до санаторіїв направляються хворі після завершення курсу реабілітації в умовах спеціалізованого відділення госпіталю	ПТСР середнього ступеня (істеричні реакції, агресивність, тимчасова втрата пам'яті, депресія, підвищена чутливість до шуму, сильний страх, втрата почуття реальності дій, що відбуваються). ПТСР тяжкого ступеня (порушення слуху, зору, координації рухів, психорухові розлади – від безглузвих вчинків до розвитку ступору)	+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	F 45.3	Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи	Нейроциркуляторна дистонія	Кризовий захворювання	+	+	+	+	+	+	+
11	F 48.0	Неврастенія	Неврастенія гіпер-, гіпостенічної форм та подразнювальної слабкості	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії	+	+	+	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	VI			Хвороби нервової системи							
13	G 00, G 09	Наслідки запальних захворювань центральної нервової системи	1. Церебральний арахноїдит (конвексимальна й задньочерепна форми) у стадії ремісії – через 3 – 6 місяців від початку захворювання. 2. Залишкові явища після перенесеного кліщового, постгрипозного, вакцинального, ревматичного та інших форм енцефаліту, у тому числі гіпоталамічний, вегетосудинний синдром з поодинокими пароксизмами – за збереження здатності до самостійного пересування та	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			самообслуговування. 3. Енцефаліт та мієліт після закінчення гострого періоду – не раніше ніж через 4 місяці після захворювання зі збереженням здатності до самостійного пересування та самообслуговування, з ознаками триваючого відновлення й відсутності розладів функції тазових органів								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	G 35	Розсіяний множинний склероз	Розсіяний склероз із пізнім дебютом – нечітко виражені форми без значних порушень рухових, тазових та когнітивних функцій – за можливості самообслуговування	Виразні форми зі значними порушеннями рухових функцій, що унеможливають самообслуговування, загальні протипоказання для санаторно-курортного лікування	+	+		+		+	
15	G 43	Мігрень	Різні форми мігрені без частих нападів	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії	+	+		+	+	+	+
16	G 51	Ураження лицевого нерва (VII черепного нерва)	G 51.0 – параліч Белла, G 51.1 – запалення ганглія колінця, G 51.2 – синдром Мелькерсона-Розенталя, G 51.8 – інші ураження лицевого нерва	Гострий період захворювання. Наявність контрактур та синкінезій є протипоказаннями до електротерапії. Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	G 54 – G 59	Мононевропатії, тунельні синдроми	Усі форми мононевропатій, тунельних синдромів	Загальні протипоказання для санаторно-курортного лікування, гострий період захворювання, виразні порушення в руховій сфері (паралічі, що перешкоджають самостійному пересуванню) та значні розлади функції тазових органів (крім хворих, які направлені в санаторії для лікування травм та хвороб хребта і спинного мозку), наявність м'язових атрофій, що потребує хірургічної корекції	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	G 61 – G 64	Поліневропатії та інші розлади периферичної нервової системи	Усі форми поліневропатій, крім G 63.1 (поліневропатія при новоутвореннях) – через 3 – 4 місяці після завершення гострого захворювання	G 63.1 Поліневропатія при новоутвореннях, загальні протипоказання для санаторно-курортного лікування, гострий період захворювання та 3 – 4 місяці після нього, виразні порушення в руховій сфері (паралічі, що перешкоджають самостійному пересуванню) та значні розлади функції тазових органів (крім хворих, які направлені в санаторії для лікування травм та хвороб хребта і спинного мозку), наявність м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	IX	Хвороби системи кровообігу									
20	I 05.1	Ревматична недостатність мітрального клапана	Недостатність мітрального клапана серця без ознак активності ревматичного процесу, у стані компенсації або за серцевої недостатності, не вищої за II A стадію, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності (групово, політопна, часта екстрасистоія, пароксизмальні порушення серцевого ритму, атріовентрикулярна блокада, вища за I ступінь, повна блокада ніжок пучка Гіса)	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за II A стадію. Повна блокада ніжки пучка Гіса. АВ блокада II, III ступеня, політопна, групово екстрасистоія. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами. Фібриляція передсердь із серцевою недостатністю, вищою за I стадію	+				+		+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Поєднана мітральна вада агіоventрикулярно-го отвору з не більше ніж II ступенем стенозу, без ознак активності процесу, у стані компенсації або серцевої недостатності I стадії								
21	I 05.2	Ревматичні хвороби мітрального клапана. Мітральний стеноз із недостатністю мітрального клапана	Поєднана мітральна вада серця із переважанням недостатності мітрального клапана без ознак активності процесу – у стані компенсації або за серцевої недостатності, не вищої за I стадію, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за I стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	I 05.8	Ревматичні хвороби мітрального клапана. Поєднана мітральна вада серця із серцевою недостатністю I стадії	Поєднана мітральна вада серця із переважанням стенозу лівого атріовентрикулярного отвору (не більше ніж II ступеня) без ознак активності процесу або з мінімальним ступенем активності у стані компенсації або серцевої недостатності, не вищої за I стадію	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за I стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		Ревматичні хвороби мітрального клапана. Поєднана мітральна вада серця із серцевою недостатністю II А стадії	Поєднана мітральна вада серця із переважанням стенозу лівого атріовентрикулярного отвору (не більше ніж II ступеня) без ознак активності процесу або з мінімальним ступенем активності та серцевою недостатністю II А стадії	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за II А стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Хронічні ревматичні хвороби серця. Стан мітральної комісуротомії	Стан після мітральної комісуротомії або інших реконструктивних операцій на клапанах серця – через 6 – 8 місяців після операції за відсутності активності ревматичного процесу, наявності компенсації або серцевої недостатності, не вищої за II А стадію, без порушень серцевого ритму	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за II А стадію. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	I 06	Ревматичні хвороби аортального клапана. Вад аортального клапана	Вад аортального клапана без ознак активності ревматичного процесу або за наявності мінімального ступеня активності із серцевою недостатністю, не вищою за I стадію, без нападів кардіального болю та високої артеріальної гіпертонії і прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за I стадію. Напади стенокардії з болям. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	I 08	Хронічні ревматичні хвороби серця. Комбінована мітрально- аортальна вада	Комбінована мітрально-аортальна вада без ознак активності ревматичного процесу в стані компенсації або за серцевої недостатності, не вищої за II A стадію, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за II A стадію. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I 09.0 – I 09.1	Інші ревматичні хвороби серця. Ревматичний ендоміокардит	Ревматичний ендоміокардит із мінімальним (I) ступенем активності: через 1 – 2 місяці після закінчення гострих явищ у хворих на первинний або зворотний ендоміокардит затяжного або латентного перебігу з ураженням клапанного апарату або без нього, із серцевою недостатністю кровообігу, не вищою за I стадію, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму (можлива наявність поодиноких екстрасистол,	Ревматичний ендоміокардит активний Міокардити з тяжким перебігом. Серцева недостатність, вища за II A стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			атріовентрикулярної блокади I ступеня) – через 6 – 8 місяців після затихання загострення за навантаженості серцевої недостатності I – II A стадії								
27	I 10	Первинна гіпертензія	Есенціальна (первинна) гіпертензія (гіпертонічна хвороба) I та II стадій доброякісного перебігу без частих гіпертонічних кризів, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, із серцевою недостатністю, не вищою за I стадію	Есенціальна (первинна) гіпертензія злоякісного перебігу, есенціальна гіпертензія III стадії з нещодавно перенесеним тяжким інфарктом, інсультом, із серцевою недостатністю, вищою за I стадію, прогностично несприятливими порушеннями ритму й провідності, порушенням азотвидільної функції нирок	+	+		+			+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	I 15	Вторинні гіпертензії	Реноваскулярна гіпертензія після реконструктивних операцій на ниркових артеріях і нирках з нормалізацією або значним зниженням артеріального тиску після операції, без виразних явищ недостатності азотвидільної функції нирок. Порушення мозкового та коронарного кровообігу із серцевою недостатністю, не вищою за І стадію, і за відсутності прогностично несприятливих порушень серцевого ритму		+			+			+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	I 20.9	Хронічна ішемічна хвороба серця. Стенокардія напруги	Стенокардія напруги внаслідок значно обмежених звичайних фізичних навантажень (II функціональний клас) без або з кардіосклерозом, із серцевою недостатністю, не вищою за I стадію, без значних порушень серцевого ритму	Ішемічна хвороба серця: а) гострий інфаркт міокарда; б) напади стенокардії за звичайних навантажень (III ФК) із серцевою недостатністю, вищою за I стадію, із порушенням ритму; в) часті напади стенокардії напруги та спокою (IV ФК) або лівошлуночкова недостатність (серцева астма)	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		Хронічна ішемічна хвороба серця. Стенокардія. Стан після хірургічного лікування ішемічної хвороби серця (ІХС)	Стан після хірургічного лікування ІХС – через 2 – 3 місяці після операції (ендоваскулярні втручання на судинах серця, аортокоронарне шунтування тощо), за серцевої недостатності, не вищої за І стадію, без порушень серцевого ритму. У віддалені терміни (1 рік і більше) після операції – за відсутності стенокардії унаслідок значних фізичних навантажень, у стані компенсації або за серцевої недостатності, не		+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			вищої за I стадію, без порушень серцевого ритму								
31	I 10 – I 15, I 20 – I 25	Хронічна ішемічна хвороба серця. Стенокардія. Стан після хірургічного лікування ІХС у поєднанні із гіпертонічною хворобою	Стан після хірургічного лікування ІХС: через 2 – 3 місяці після операції (ендоваскулярні втручання на судинах серця, аортокоронарне шунтування тощо) за серцевої недостатності, не вищої за I стадію, без порушень серцевого ритму; у віддалені терміни (1 рік і більше) після операції за відсутності стенокардії унаслідок значних фізичних навантажень у стані	Ішемічна хвороба серця: а) гострий інфаркт міокарда; б) напади стенокардії за звичайних навантажень (III ФК) із серцевою недостатністю, вищою за I стадію, з порушенням ритму; в) часті напади стенокардії напруги та спокою (IV ФК) або лівошлуночкова недостатність (серцева астма). Гіпертонічна хвороба з злоякісного перебігу, гіпертонічна хвороба III стадії з нещодавно перенесеним тяжким інфарктом, інсульт, із серцевою недостатністю,	+			+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			компенсації серцевої недостатності, не вищої за І стадію, без порушень серцевого ритму у поєднанні з гіпертонічною хворобою	вищою за І стадію, за наявності прогностично несприятливих порушень ритму й провідності, порушень азотвидільної функції нирок							
32	I 25.1	Хронічна ішемічна хвороба серця. Атеросклеротич- на хвороба серця	Атеросклеротичний кардіосклероз без стенокардії або зі стенокардією І та II функціональних класів, без тяжких порушень серцевого ритму і провідності, із серцевою недостатністю, не вищою за II А стадію	Серцева недостатність, вища за II А стадію. Повна блокада ніжки пучка Гіса. АВ блокада II, III ступенів, політопна, групово екстрасистолія. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами. Фібриляція передсердь із серцевою недостатністю, вищою за І стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		Хронічна ішемічна хвороба серця. Атеросклеротична хвороба серця	Атеросклеротичний кардіосклероз без стенокардії або зі стенокардією I та II функціональних класів, без тяжких порушень серцевого ритму і провідності, із серцевою недостатністю, не вищою за II A стадію, із нечастими екстрасистолами або нетяжкими пароксизмальними порушеннями серцевого ритму		+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	I 25.2	Хронічна ішемічна хвороба серця. Постінфарктний кардіосклероз	Постінфарктний кардіосклероз із стенокардією або без стенокардії, I та II функціональних класів без тяжких порушень ритму серця	Недостатність кровообігу, вища за II A стадію. Повна блокада ніжки пучка АВ блокада II, III ступенів, політопна, групова екстрасистолія. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами. Фібриляція передсердь із серцевою недостатністю, вищою за I стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	I 25.3	Хронічна ішемічна хвороба серця. Аневризма серця	Кардіосклероз після перенесеного інфаркту міокарда з хронічною аневризмою серця, з нечастими нетяжкими нападами стенокардії (I – II функціональні класи) без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і атріовентрикулярної блокади, вищої від I ступеня, із серцевою недостатністю, не вищою за I стадію	Серцева недостатність, вища за I стадію. Повна блокада ніжки пучка Гіса. АВ блокада II, III ступенів, політопна, групово екстрасистолія. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами. Фібриляція передсердь із серцевою недостатністю, вищою за I стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		Хронічна ішемічна хвороба серця. Аневризма серця	Стан після хірургічного лікування аневризми (резекція) – через 3 – 4 місяці й пізніше після операції, із серцевою недостатністю, не вищою від I стадії, і відсутністю порушень серцевого ритму	Серцева недостатність, вища за I стадію. Повна блокада ніжки пучка Гіса. АВ блокада II, III ступенів, політопна, групова екстрасистоля. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами. Фібриляція передсердь із серцевою недостатністю, вищою за I стадію	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	I 34.8	Неревматичні хвороби серця. Природжені вади серця	Природжені вади серця без ознак ендоміокардиту, у стані компенсації або із серцевою недостатністю, не вищою за II A стадію	Активний ревматичний процес. Серцева недостатність, вища за II A стадію	+			+		+	
38	I 42	Інші хвороби серця. Кардіоміопатія	Гіпертрофічна кардіоміопатія без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, порушень коронарного кровообігу, без серцевої недостатності або із серцевою недостатністю, не вищою за I стадію	Лівшлуночкова недостатність (серцева астма). Серцева недостатність, вища за I стадію. Повна блокада ніжки пучка Гіса. АВ блокада II, III ступенів, політопна, групово екстрасистолія. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	I 51.4	Інші хвороби серця. Міокардит неуточнений	Стан після перенесеного інфекційно- алергічного міокардиту після закінчення гострих та підгострих явищ, за наявності серцевої недостатності, не вищої за II A стадію, та відсутності тяжких порушень серцевого ритму	Міокардити з тяжким перебігом. Серцева недостатність, вища за II A стадію. Пароксизмальні порушення ритму, що супроводжуються нестабільною гемодинамікою або частими пароксизмами. Тромбоемболічна хвороба	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	I 67.2	Церебральний атеросклероз (хронічні порушення мозкового кровообігу) Наслідки цереброваскулярних хвороб	Початкові прояви недостатності мозкового кровообігу та дисциркуляторна енцефалопатія I та II стадій 1. Транзиторна ішемія ("малий інсульт" без повторних кризів і гіпертонічної хвороби II та III стадій – через 3 – 4 місяці після нападу). 2. Минуці порушення мозкового кровообігу, ангіодистонічні церебральні кризи, які протікають із вогнищевою органічною симптоматикою, що регресувала протягом	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			однієї доби, – не раніше 2 тижнів від розвитку захворювання. 3. Наслідки субарахноїдального, субарахноїдально-паренхіматозного крововиливу – не раніше 4 – 6 місяців, за збереження здатності до самообслуговування й самостійного пересування, без зниження інтелекту, афазії. 4. Наслідки внутрішньомозкового крововиливу (геморагічного інсульту) – не раніше 4 – 6 місяців, за збереження здатності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			до самообслуговування й самостійного пересування, без зниження інтелекту, афазії і потреби оперативного втручання 5. Наслідки закупорки або стенозу церебральних магістральних артерій, мозкових артерій (інфаркту мозку) – у відновлювальному періоді, не раніше 4 – 6 місяців, за збереження здатності до самообслугову- вання й самостійного пересування, без зниження інтелекту, афазії.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Форми ішемічних інсультів з помірною й невиразною вогнищевою органічною неврологічною симптоматикою, яка регресувала повністю або частково протягом 1 – 2 тижнів. 7. Стан після операцій на магістральних артеріях ший й голови або екстра- чи інтракраніальних анастомозів без залишкових післяопераційних ускладнень або з вогнищевою органічною неврологічною симптоматикою, яка регресувала повністю								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			або частково протягом 2 тижнів, – не раніше ніж через 6 тижнів після операції								
41	I 70.2	Атеросклероз артерій кінцівок	Облітеруючий ендартеріїт порушення кровообігу нижніх кінцівок I та II ступенів – у період стійкої ремісії	Стан поза періодом стійкої ремісії, недостатність кровообігу II ступеня	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	I 80 – I 80.3	Флебіт і тромбофлебіт судин нижніх кінцівок	Залишкові явища після флебіту, тромбофлебіту нижніх кінцівок. Після закінчення гострих та підгострих проявів – не раніше ніж через 4 місяці після тромбофлебіту глибоких вен (посттромбофлебіт- ний синдром) та через 2 місяці після тромбофлебіту поверхневих вен без трофічних змін шкіри (варикозних виразок)	Наявність гострого тромбофлебіту та трофічних виразок, незагоєних ран. Ранній післягоспітальний період	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	I 83	Варикозне розширення вен нижніх кінцівок	Хронічна венозна недостатність	Наявність гострого тромбозу та трофічних виразок, незагоєних ран	+			+		+	
44	X			Хвороби органів дихання							
45	J 12 – J 18	Пневмонії	Стани перенесеної негоспітальної та нозокоміальної неускладнених пневмоній, після пневмоній, ускладнених інфекційним міокардитом або ексудативним плевритом	Пневмонія у стадії загострення, та пневмоклероз та пневмоконіози, які супроводжуються легенево-серцевою недостатністю, вищою за II ступінь; хронічна рецидивуюча форма тромбоемболії легеневої артерії; бронхоектази, хронічні абсцеси легень за суттєвого виснаження хворих, які супроводжуються виділенням гнійного мокротиння та кровохарканням	+			+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	J 30	Вазомоторний риніт	Усі форми вазомоторного риніту	Гостра стадія процесу					+	+	+
47	J 31, J 32, J 35	Хронічні риніт, фарингіт, синусит, хронічні хвороби ротоглоткових та носоглоткових мигдаликів	Усі форми хронічних ринітів, синуситів, тонзилітів	Гостра стадія процесу					+	+	+
48	J 41, J 42,	Хронічний бронхіт, трахеобронхіт	Хронічний бронхіт, трахеобронхіт у стадії ремісії	Хронічний обструктивний бронхіт у стані загострення, за наявності легеневої серцевої недостатності II стадії та вище. Наявність кровохаркання				+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	J 44, J 44.8, J 44.9	Хронічний обструктивний бронхіт	Хронічний обструктивний бронхіт у стадії ремісії, легенева недостатність I стадії	Хронічний обструктивний бронхіт у стані загострення за наявності легенево- серцевої недостатності, вищої за II стадію				+	+	+	+
50	J 45	Бронхіальна астма	J 45, J 45.0, J 45.1, J 45.8, J 45.9. Бронхіальна астма у фазі ремісії	Бронхіальна астма у стані загострення, неконтрольована бронхіальна астма				+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	J 47	Бронхоектатична хвороба	Бронхоектатична хвороба легкої форми	Бронхоектатична хвороба у стані загострення, з тяжкими та ускладненими формами, амліодоз, бронхоектази, хронічні абсцеси при істотному виснаженні хворих, підвищенні температури тіла, які супроводжуються виділенням рясного гнійного мокротиння та кровохарканням, спонтанний пневмоторакс				+	+	+	+
			Бронхоектатична хвороба середньотяжкої форми					+		+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	J 60 – J 63	Хвороби легень, що спричинені зовнішніми агентами	Асбестоз, екзогенний алергічний альвеоліт (обумовлений контактом з органічним пилом), пневмоконіоз (силікоз)	Пневмоконіози у фазі загострення захворювання або які супроводжуються легенево-серцевою недостатністю, вищою за II ступінь, хронічна рецидивуюча форма тромбоемболії легеневої артерії, бронхоектази, хронічні абсцеси легень при істотному виснаженні хворих, які супроводжуються виділенням гнійного мокротиння та кровохарканням					+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	XI	Хвороби органів травлення									
54	K 21	Гастро- езофагеальна рефлюксна хвороба (GERX)	K 21.0. GERX езофагітом. K 21.9. GERX без езофагіту	Наявність ускладнень GERX: гостра кровотеча; перфорація стравоходу; метаплазія (стравохід Баррета); медіастеніт; непротидність стравоходу (K 22.2); виразка стравоходу (K 22.1)			+			+	
55	K 22.0	Функціональні езофагеальні розлади	Функціональні езофагеальні розлади. Функціональна печія. Функціональна торакалія вірогідно езофагеального генезу. Функціональна дисфагія. Глобус	Відсутні			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	К 22.0	Ахалазія кардіальної частини шлунку	К 22.0. Ахалазія кардіальної частини шлунку	Кардіостеноз із S-подібною формою стравоходу та істотним його розширенням. Езофагіт 4 ступеня			+			+	
57	К 25 – К 28	Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки у стадії ремісії та нестійкої ремісії	К 25. Виразка шлунку. К 26. Виразка дванадцятипалої кишки. К 27. Пептична виразка неуточненої локалізації. К 28. Гастроюнальна виразка	Загострення патологічного процесу; ускладнена виразкова хвороба, субкомпенсована стенозом, повторними кровотечами, що мають місце останні 8 – 10 місяців, пенетрацією виразки			+			+	
58	К 29	Хронічний гастрит із секреторною недостатністю	К 29.3. Хронічний неатрофічний гастрит. К 29.4. Хронічний атрофічний гастрит	Загострення патологічного процесу, поліпоз шлунка			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			К 29.3. Хронічний неатрофічний гастрит. К 29.4. Хронічний атрофічний гастрит	Загострення патологічного процесу			+			+	
59	К 30	Функціональна диспепсія	Виразкоподібна форма. Диспепсична форма. Змішана форма	Відсутні			+			+	
60	К 44	Кила стравохідного отвору діафрагми	К 44. Діафрагмальна кила	Наявність ускладнень у вигляді гострої кровотечі, защемлення шлунка, некрозу шлунка, скорочення стравоходу. Субтотальна та тотально-шлункова аксіальна кила. Субтотальна та тотальна параезофагеальна шлункова кила. Параезофагеальна кила			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	К 52	Хронічний коліт	Усі форми хронічного коліту у стадії ремісії	Стадія загострення			+			+	
62	К 57	Дивертикулярна хвороба кишківника	Дивертикулярна хвороба кишківника	Наявність болювого синдрому або будь-якого ускладнень: дивертикуліт, кровотеча, перфорація, абсцес, перитоніт			+			+	
63	К 58	Синдром подразненого кишківника	К 58.0. Синдром подразненого кишківника з діареєю. К 58.9. Синдром подразненого кишківника без діареї	Стадія загострення за умов вираженого болювого синдрому на тлі констипації			+			+	
64	К 70, К 71	Хронічний алкогольний гепатит та токсичне ураження печінки	Хронічний алкогольний гепатит та токсичне ураження печінки (неактивна фаза або стадія мінімальної активності)	Гострий алкогольний гепатит, гостре токсичне ураження печінки, ускладнення у вигляді цирозу печінки та кровотеч			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	К 80 Жовчнокам'яна хвороба		К 80.1. Камінь жовчного міхура з іншим холециститом, фаза ремісії. К 80.4. Холедохокалькульоз з холециститом – калькульозний та безкам'яний	Наявність загострень патологічного процесу, ускладнень, підвищення температури тіла, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), явищ жовтяниці, каменів у жовчних протоках, явищ холангіту			+			+	
66	К 81 Хронічний некалькульозний холецистит		К 81.1. Хронічний холецистит. К 81.8. Інші форми холециститу. К 81.9. Холецистит неуточнений	Наявність загострень патологічного процесу, підвищення температури тіла, ШОЕ, явища жовтяниці			+			+	
67	К 82.8, К 83.4 Дисфункціональ- ні розлади біліарного тракту		Дисфункція жовчного міхура. Дисфункція сфінктера Одді біліарного типу або панкреатичного типу	Відсутні			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	K 86.1	Хронічний панкреатит	Інші хронічні панкреатити: паренхіматозний, обструктивний, кальцифікуючий у стадії ремісії	Стадія загострення; тяжкі форми хронічного панкреатиту з виразними порушеннями травлення і загального стану			+			+	
69	K 91.1	Синдроми оперованого шлунку	Післягастрорезекційні синдроми. Функціональні синдроми: демпінг-синдром, гіпоглікемічний, привідної петлі, післяопераційної астенії, дискінезія жовчних шляхів, порушення функції кишківника, порушення функціональної діяльності підшлункової залози, рефлюкс-езофагіт. Органічні синдроми: синдром привідної	Демпінг-синдром (тяжка форма). Гіпоглікемічний синдром (тяжка форма). Синдром привідної петлі. Ускладнення після операції на шлунку (тяжка форма). Пептична виразка у стадії загострення зі схильністю до кровотечі, пенетруюча, при хворобі Золінгера-Елісона. Хронічний гепатит в активній фазі. Хронічний панкреатит у стадії загострення. Рак культі шлунка			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			петлі, рецидивна виразка шлунка, хронічний гастрит шлунка, хронічний анастомозит, пептична виразка анастомозу, хронічний ентерит, хронічний коліт, хронічний післягастрорезекційний панкреатит, післягастрорезекційна анемія. Змішані (поєднання двох або декількох синдромів)								
70			Післяваготомічні синдроми. Функціональні синдроми: астенічний післяваготомічний синдром, демпінг-синдром,	Пептична виразка у стадії загострення зі схильністю до кровотечі, пенетрації, з хворобою Золінгера-Елісона. Демпінг-синдром (тяжка форма). Шлунковий та			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			гіпоглікемічний синдром, гіпотонія шлунка, діарея, порушення загальної функції серця. Органічні синдроми: рецидив виразки шлунка, рецидив виразки дванадцятипалої кишки, рефлюкс- езофагіт, хронічний без'кам'яний холецистит, жовчнокам'яна хвороба, хронічний панкреатит. Змішані ураження	дуоденальний (тяжка форма). Хронічний панкреатит у стадії загострення. Постваготомічна діарея (тяжка форма)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	K 91.5	Післяхолецист-ектомічний синдром (ПХЕС)	Ураження жовчних шляхів. Стриктур та деформації жовчних шляхів. Синдром кукси міхурового протоку. Рефлюкс-холангіт після сфінктеропластики та холедохододеностомії	Наявність частих загострень патологічного процесу, ускладнень, підвищення температури тіла, ШОЕ, явищ жовтяниці, каменів у жовчних протоках, явищ холангіту			+			+	
72	XII	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини									
73	L 20.8	Атопічний дерматит	Нейродерміт обмежений, дифузний у хронічній стадії	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих на санаторно-курортне лікування		+				+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	L 30	Інші дерматити	Монетоподібна екзема, дисгідроз, шкірна авто-сенсibiliзація, інший уточнений дерматит – у підгострій чи хронічній стадії	Гостра стадія екземи, мікробна екзема		+				+	
75	L 40	Напівсквамозні порушення. Псоріаз	Псоріаз звичайний, краплиноподібний, артропатичний, акродерматит стійкий, інший псоріаз, псоріаз неуточнений – у стадії стабілізації та стадії регресу (примітка: хворі на зимову форму псоріазу підлягають санаторно-курортному лікуванню влітку)	Прогресуюча стадія псоріазу		+				+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	L 41	Парапсоріаз	Парапсоріаз дрібнобляшковий, великобляшковий, сіткоподібний, інший парапсоріаз, парапсоріаз неуточнений у стаціонарній стадії чи стадії регресу	Гостра парапсоріаза стадія		+				+	
77	L 43.0	Лишай червоний плескатий	Типові та атипові форми: лишай гіпертрофічний червоний плескатий, лишай червоний, плескатий підгострий, інший червоний плескатий лишай, лишай червоний плескатий неуточнений). Підгостра та хронічна стадії	Гостра захворювання стадія		+				+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	L 50	Кропив'янка	Кропив'янка алергічна, ідіопатична, спричинена дією низької або високої температури, дерматографічна, вібраційна, холінергічна, контактна, інша кропив'янка, не кропив'янка – у уточнена – у хронічній стадії	Гостра кропив'янки стадія		+				+	
79	L 63	Гніздова алопеція (облісіння)	Алопеція тотальна, універсальна, гніздова плішивість, інша гніздова алопеція, гніздова алопеція неуточнена – у стаціонарній чи прогресивній стадії	Відсутні		+				+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	L 94.0	Локалізована склеродермія (морфея)	Склеродермія бляшкова, обмежена, неактивна стадія. Склеродермія системна ураженням опорно-рухового апарату в неактивній стадії після курсу медикаментозного лікування	Пігментна розповсюджена склеродермія, усі форми в активній стадії та		+				+	
81	XIII	Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини									
82	M 2.3, M 79	Наслідки перенесеного ревматичного поліартриту	Наслідки перенесеного ревматичного поліартриту – через 6 – 8 місяців після закінчення гострих та підгострих явищ з боку серця і наявності серцевої недостатності, не вищої за I стадію	Серцева недостатність, вища за I стадію	+	+					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	М 05	Запальні поліартропатії. Ревматоїдний артрит	Серопозитивний ревматоїдний артрит	Активність процесу III стадії	+	+		+			
84	М 10	Запальні артропатії	Подагра	Періоди активності процесу посилення запального	+	+		+		+	
85	М 15, М 16, М 17, М 18, М 19	Артопатії. Артрози	Поліартроз, коксартроз, гонартроз, артроз першого променево- зап'ясткового суглоба, інші артрози – з залишковими явищами синовіту	Виражений синовіт	+	+		+		+	
86	М 42, М 47, М 54	Деформуючі дорсопатії. Остеохондроз. Спондильоз. Дорсалгії	Остеохондроз хребта із вторинними неврологічними порушеннями та без них, спондильоз, дорсалгії – за відсутності ознак загострення	Періоди хвороби загострення	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	M 45	Дорсопатії. Спондилопатії.	Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева) – за відсутності ознак активності процесу або за наявності незначної активності (I ступеня)	Активність процесу II та III ступенів	+	+		+		+	
88	XIV	Хвороби сечостатевої системи									
89	N 11	Тубуло- інтерстиціальні захворювання нирок	Хронічний тубулоінтерстиціаль- ний нефрит (хронічний пієлонефрит)	Хронічний пієлонефрит у фазі активного запалення, наявність ознак декомпенсації нирок (олігурія, підвищений залишковий азот); полікістоз нирок; гідронефроз II стадії і вище			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	N 20 – N 23	Сечокам'яна хвороба	Сечокам'яна хвороба, ремісії стадія	Гострі запалення сечовивідних шляхів, наявність ознак декомпенсації нирок (олігурія, підвищений залишковий азот); полікістоз нирок, декомпенсований гідронефроз; коралоподібні рецидивні камені нирок або камені, що потребують негайного видалення, стриктури уретри, доброякісна гіперплазія передміхурової залози 2, 3 стадій з виразними порушеннями сечовипускання, нетримання сечі, макрогематурія			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	N 30	Інші хвороби сечової системи. Цистит	Хронічний цистит	Специфічний інфекційний цистит у гострій і підгострій стадіях (туберкульоз, сифіліс, гонорея тощо), поліпозний, виразковий, геморагічний проктит, виразні порушення сечовипускання, злоякісні пухлини			+			+	
92	N 40 – N 51	Хвороби чоловічих статевих органів	N 41.1. Запальні хвороби передміхурової залози	Гострі і підгострі захворювання передміхурової залози, а також навколишніх органів (гострий і підгострий цистит, проктит тощо), специфічний інфекційний простатит у гострій і підгострій стадіях (туберкульоз, сифіліс, гонорея тощо), поліпозний, виразковий, геморагічний проктит, тріщини заднього			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				проходу, геморой, що кровоточить, доброякісна гіперплазія передміхурової залози 2, 3 стадій з виразними порушеннями сечовипускання, злаякісні пухлини							
93			N 46. Чоловіче безпліддя	Гострі і підгострі захворювання передміхурової залози, а також навколишніх органів (гострий і підгострий цистит, проктит тощо), специфічний інфекційний простатит у гострій і підгострій стадіях (туберкульоз, сифіліс, гонорея тощо), поліпозний, виразковий, геморагічний проктит, тріщини заднього проходу, геморой, що кровоточить,			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				доброякісна гіперплазія передміхурової залози 2, 3 стадій з виразними порушеннями сечовипускання, злоякісні пухлини							
94	N 70 – N 99	Запальні, незапальні захворювання жіночих статевих органів, інші захворювання сечостатевої системи	N 70.1. Хронічний сальпінгіт і оофорит. N 71.1. Хронічний метрит та ендометрит. N 73.1. Хронічний параметрит. N 73.6. Тазові спайки очеревини. N 85.4. Неправильні положення матки. N 85.6. Внутрішньоматкові спайки. N 97.1. Жіноча безплідність трубного походження. N 97.2. Жіноча безплідність	Запальна стадія захворювання. Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих на санаторно-курортне лікування			+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			маткового походження. N 99.4. Тазові перитонеальні спайки післяопераційні								
95	N 80 – N 98	Незапальні захворювання жіночих статевих органів, пов'язані з відсутністю овуляції	N 92. Дисфункція яєчників. N 91.1. Вторинна аменорея. N 91.4. Вторинна олігоменорея. N 97.0. Безплідність жіноча, пов'язана з відсутністю овуляції	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих на санаторно-курортне лікування		+	+	+		+	
96	N 95.1	Незапальні захворювання жіночих статевих органів. Порушення менопаузи та інші порушення навколомено- паузального періоду	Патологічний клімакс	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих на санаторно-курортне лікування		+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	XIV	Травми, отруєння та деякі інші наслідки впливу дії зовнішніх чинників									
98	S 06, T 90	Наслідки черепно-мозкової травми	1. Наслідки закритих (через 2 місяці) та відкритих (через 5 місяців) травм головного мозку за наявності астенічного, вегето- судинного, гіпоталамічного синдромів без виразної гіпертензії, які не супроводжуються істотними порушеннями в руховій сфері, що перешкоджають самообслуговуванню та самостійному пересуванню, без епілептичних нападів та психічних порушень.	Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих на санаторно-курортне лікування	+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Наслідки тяжких травм (після контузії, відкритих чи закритих черепно-мозкових травм, хірургічного видалення внутрішньочерепної гематоми) за наявності рухових розладів, але з можливістю самостійного пересування та самообслуговування, – через 2 місяці після травми (за відсутності епілептичних та епілептиформних нападів). 3. Хворі після струсу головного мозку – через 1 місяць після травми								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	S 14, S 24,	Травми спинного мозку	Наслідки травм спинного мозку, кінського хвоста з легкими тетра- або парапарезами, без обмеження здатності до самообслуговування й самостійного пересування, без грубих порушень функції тазових органів, – через 4 місяці після травми або ортопедичної нейрохірургічної операції	Виразні форми зі значними порушеннями рухових і тазових функцій та нездатності до самообслуговування, загальні протипоказання для санаторно- курортного лікування	+	+		+		+	

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	S 34	Наслідки травм верхньої або нижньої кінцівки. Артрит посттравматичний	Артрит посттравматичний після тривалої іммобілізації – через 4 – 6 місяців після операції	Ранній післяопераційний період	+	+	+	+		+	

Командувач Медичних сил Збройних Сил України
генерал-майор медичної служби

Ігор ХОМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

09 грудня 2015 року № 703

(у редакції наказу Міністерства оборони України

24 серпня 2020 року № 294)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
"11" вересня 2020 року
за № 848/35461

ПЕРЕЛІК

медичних показань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України

№ з/п	Код за МКХ-10	Стани та захворювання	Показання до реабілітаційного лікування	Протипоказання до реабілітаційного лікування	Профільний санаторій						
					ЦМР та СЛ "Пуща-Водиця"	ЦВКС "Хмільник"	ЦМР та СЛ "Трускавецький"	ЦМР та СЛ "Одеський"	ЦВС "Приморський"	Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону	Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Нейрореабілітація										
2	G 45	Підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм	1. Транзиторні церебральні ішемічні напади та споріднені синдроми – через 2 тижні	1. Гостре порушення мозкового кровообігу з наявністю виразних рухових, психічних або мовних розладів, що перешкоджають самостійному пересуванню або мовному контакту, трофічних і тазових порушень. 2. Хвороби нервової системи будь-якої етіології в гострому періоді захворювання. 3. Епілепсія. 4. Хронічна ішемія мозку (дисциркуляторна енцефалопатія) з виразним психоорганічним синдромом або	+	+		+		+	
3	I 60		2. Субарахноїдальний крововилив – через 4 – 6 місяців		+			+		+	
4	I 61		3. Внутрішньо-мозковий крововилив – через 4 – 6 місяців		+			+		+	
5	I 62		4. Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив – через 4 – 6 місяців		+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I 63		5. Інфаркт головного мозку через 4 місяці	деменцією. 5. Виразні іпохондричні, депресивні або обсесивно-компульсивні порушення. 6. Не виключена з	+	+		+		+	
7	I 64		6. Інсульт, не уточнений як кроволив чи інфаркт – через 4 місяців	кровоотку, верифікована ангіографією аневризма або мальформація судин головного мозку.	+	+		+		+	
8	I 69		7. Наслідки цереброваскулярних хвороб – в період постановки діагнозу	7. Артеріальна гіпертензія з кризовим перебігом, виразними коливаннями артеріального тиску, недостатньо коригованою медикаментозною терапією або зі стабільним	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	S 06		8. Внутрішньочерепна травма: хворі з наслідками травм головного мозку у вигляді астеничного, вегетосудинного, гіпоталамічного синдрому та після хірургічного видалення внутрішньочерепної гематоми без різко вираженої гіпертензії, епілептичних/епілептиформних нападів та психічних порушень, за наявності рухових розладів, але з можливістю самостійного пересування та самообслуговування – через 6 місяців після травми	перебігом, з показниками систолічного тиску на тлі гіпотензивної терапії вище 180 мм рт. ст. 8. Недостатність кровообігу, вища за II А стадію. 9. Хронічна коронарна недостатність, вища за II ступінь, з гострим інфарктом або повторними інфарктами міокарда в анамнезі. 10. Порушення серцевого ритму і провідності (пароксизми мерехтіння і тріпотіння передсердь, пароксизмальна тахікардія, політопна	+	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				і група екстрасистоля, атріовентрикулярна блокада II та III ступенів, повна блокада серця). 11. Аневризма серця з явищами недостатності кровообігу, вища за I стадію. 12. Аневризма аорти з явищами недостатності кровообігу, вища за I стадію. 13. Тромбоемболія гілок легеневої артерії і тромбоемболічні порушення інших внутрішніх органів в анамнезі. 14. Цукровий діабет тяжкого перебігу або у стадії							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				декомпенсації. 15. Загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	М'язово-скелетна реабілітація										
11	S 42.3, S 52, Z 54.5	Підгострий період після операцій на опорноруховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання	1. Наслідки діафізарних переломів плечової кістки і кісток передпліччя після стабільно функціонально- го остеосинтезу не раніше 3 – 4 тижнів після оперативного втручання	1. Переломи кісток при наявності глухих гіпсових пов'язок на кінцівках (S00 – S99). 2. Переломи кісток при наявності на кінцівках апаратів зовнішньої фіксації для черезкісткового остеосинтезу (S 00 – S 99). 3. Відсутність зіставлення і фіксації кісткових уламків при переломах кісток, тобто, безперспективність відновлювального лікування (S00 – S99). 4. Переломи кісток кінцівок з наявністю інфікованих ран, трофічних виразок (S00-S99).	+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	S 43.0		2. Вивих плечового суглобу оперований	5. Запальні поліартропатії II – III ступеню активності, рентгенологічна стадія IV, ФНС III ступеня (M 05 – M 14). 6. Тяжкі супутні захворювання: гіпертонічна хвороба III ступеня (I 10-I 13); складні порушення провідності та ритму (передсердно-шлуночкова блокада повна (I 44.2), пароксизмальна тахікардія (I 47) з частотою приступів більше як два рази на місяць, фібриляція та тріпотіння передсердь (I 48), фібриляція та тріпотіння шлуночків (I 49.0),	+	+	+	+			
13	S 72, S 82, Z 54.5		3. Наслідки переломів стегнової кістки та кісток гомілки після стабільно функціонального остеосинтезу не раніше 5 – 6 тижнів після оперативного втручання		+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	S 82, Z 54.5		4. Перелом кісток гомілки, включаючи гомілково-ступневий суглоб (підгострий період після оперативного втручання)	екстрасистолічна аритмія (політопна, часта, групова) (I 49.4); IXC: стенокардія III – IV функціональний клас (I 20); серцева недостатність IIA – III (I 50); цукровий діабет некомпенсований (E 10 – E 14); печінкова недостатність (K 72); ниркова недостатність (N 17 – N 18). 7. Інші загальні протипоказання, що унеможливають направлення хворих у санаторії.	+	+	+	+		+	
15	S 32, S 32.4, Z 54.5		5. Наслідки перелому кісток тазу та вертлюжної западини через 8 – 10 тижнів після травми (підгострий період після оперативного втручання)		+	+	+	+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	S 83.2		6. Розрив меніска через 2 тижні після операції	8. Неможливість самостійного пересування та самообслуговування хворого	+	+	+	+		+	
17	S 40 – S 69, S 70 – S 99, Z 54.5		7. Наслідки переломів кісток кінцівок після стабільно-функціонального остеосинтезу через 2 – 3 тижні після операції (підгострий період після оперативного втручання)		+	+	+	+		+	
18	M 51		8. Стани після операцій з приводу кил міжхребцевих дисків через 2 – 3 тижні після операції		+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	M 16, M 17, M 19		9. Стани після ендопротезування великих суглобів (підгострий період після оперативного втручання)		+	+	+	+		+	
20	Z 54.0, M 21		10. Стани після мікрохірургічних операцій з приводу реплантації пальців та кінцівок, стани після операцій з метою пересадки пальців, а також посттравматичних деформацій кісток та пальців, вільної та шкіряної пластики		+	+	+	+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	M 05		11. Ревматоїдний артрит (серопозитивний), повільно прогресуючий перебіг I ступеня активності, рентгенологічна стадія I – III, ФПС I – II ступеня		+	+	+	+		+	
22	M 02		12. Реактивні артропатії, хронічно-рецидивуючий перебіг, різної етіології з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I – III, ФПС I – II ступеня		+	+	+	+		+	
23	M 10		13. Подагра (подагричний поліартрит), позаприступний період, з виходом у вториннодеформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I – III, ФПС I – II ступеня		+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	M 45		14. Анкілозуючий спондиліт (спондилоартрит) I ступеня активності, різні клінічні варіанти, рентгенологічна стадія I – III, ФПС I – II ступеня		+	+	+	+		+	
25	M 15, M 16, M 17, M 18, M 19		15. Первинно- деформуючий остеоартроз, вузликова та без вузликова форми, з ураженням дрібних і великих суглобів, хребта, без синовітів, рентгенологічна стадія I – III, ФПС I – II ступеня		+	+	+	+		+	
26	M 15.3, M 16.4, M 17.2, M 18.2, M 19.1		16. Вторинно- деформуючий остеоартроз (посттравматичний), рентгенологічна стадія I – III, ФПС I – II ступеня		+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Кардіологічна реабілітація										
28	I 21.0 – I 21.9, I 22.0 – I 22.9	Підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них), стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них), підгострий період після операцій на серці. Лікуванню в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів підлягають хворі відповідно до медичних показань, які здатні до самообслуговування, досягли та адекватно виконують певний	1. Підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них): первинний гострий інфаркт міокарда; повторний інфаркт міокарда	1. Недостатність кровообігу вище II А ступеня (I 50.0); 2. IXC: стенокардія IV функціонального класу (I 20.0 – I 20.9); 3. Важкі порушення серцевого ритму і провідності: пароксизми фібриляції передсердь, що виникають чотири чи більше разів на місяць (I 48); пароксизмальна тахікардія (I 47.0, I 47.1, I 47.9) з частотою нападів більше ніж два – три рази на місяць; екстрасистоля (I 49.8) політопна, групова і рання (R на T);	+						+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	I 20	рівень фізичної активності (дозована ходьба до 1000м в 2 – 3 прийоми, підйом східцями на 17 – 22 сходинки без неприємного відчуття) на підставі клініко-електрокардіографічного контролю і не мають протипоказань	2. Стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них)	передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня (I 44.1); передсердно-шлуночкова блокада повна (I 44.2). 4. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення: легенева емболія зі згадкою про гостре легеневе серце (I 26.0); легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце (I 26.9); емболія та тромбоз інших вен (I 82). 5. Підгострий перикардит (I 30). 6. Інші хвороби перикарда (I 31). 7. Інсулінозалежний цукровий діабет	+					+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	I 33 – I 39, I 42, D 15.1, I 97, I 97.1		3. Підгострий період після операцій на серці: з приводу вроджених вад серця, інфекційного ендокартиту; з приводу дилатаційної та гіпертрофічної кардіоміопатії; після видалення міксому серця; порушення системи кровообігу після медичних процедур (підгострий період після операцій на серці); інші функціональні порушення після операцій на серці; стан після хірургічного втручання з приводу аортокоронарного протезування аортального та мітрального клапанів операції операції. Ознаки, резекції аневризми серця, аневризми	(E 10) (некомпенсований і важкого перебігу). 8. Печінкова недостатність (K 72). 9. Ниркова недостатність (N 17 – N 18) вище I ступеня. 10. Гостре порушення мозкового кровообігу в гострому або підгострому періоді (I 60 – I 64)	+					+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			коронарної артерії, аневризми аорти, стан після ангіопластики, стентування коронарних судин. 4. Стан після відновлення синусового ритму у хворих з фібриляцією- тріпотінням передсердь, із суправентрикулярними та шлуночковими порушеннями ритму після проведення інвазивних втручань: катетерної радіочастотної деструкції (абляції); дефібриляції та кардіоверсії; імплантація або заміна штучного водія ритму; імплантація кардіовертера- дефібрилятора								
31	I 48, I 47.0 – I 47.9				+					+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Пульмонарна реабілітація										
33	J 85, J 86, J 93 – J 95, D 14, J 47, J 85	Підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру	Підгострий період після операції на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру: 1. Стан після оперативних втручань на органах дихання при захворюваннях нетуберкульозної та неонкологічної етіології. 2. Стан після оперативних втручань з приводу вроджених вад і новоутворень в легенях доброякісного характеру. 3. Хворі після перенесених ефективних оперативних втручань на легенях з приводу обмежених бронхоспазмів. 4. Абсцеси легень: стан	1. Стан після оперативного втручання на легенях при наявності трахеобронхіальних свищів. 2. Стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів при наявності плевральних випотів. 3. Загострення бронхоектатичної хвороби (J 47), хронічного бронхіту (J 41) з підвищеною температурою тіла, з великою ШОЕ та іншими змінами гемограми. 4. Бронхіальна астма	+			+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			після хірургічного втручання, через 2 – 3 місяці після операції, без явищ інтоксикації, при легенево-серцевій недостатності не вище I Б ст.	з тяжкими нападами, що часто повторюються, а також нападами середньої важкості, без стійкої стабілізації процесу на фоні базисної терапії (J 45.0 – J 45.1)							
34	J 12 – J 18, J 47, J 44, J 44.8, J 44.9, J 94		Підгострий період захворювань легень: 1. Стан після перенесеної пневмонії, при легенево-серцевій недостатності не вище I Б стадії. 2. Бронхоектатична хвороба, при обмежених інфільтративних змінах та відділення гнійного харкотиння, при легенево-серцевій недостатності не вище I Б ст. 3. Інша хронічна обструктивна хвороба легень, при легенево-серцевій недостатності не вище II ст.		+			+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Плеврити, плевральні спайки після перенесеного сухого та ексудативного плевриту, при легенево-серцевій недостатності не вище I Б стадії								
35	Ендокринологічна реабілітація										
36	Е 10, Е 11, Е 10.5, Е 11.5, Е 10.3, Е 11.3, Е 10.2, Е 11.2, Е 10.4, G 63.2, Е 11.4, G 63.2, R 73.0	Цукровий діабет. Знижена толерантність до глюкози	1. Цукровий діабет 1-го та 2-го типів в стадії компенсації або субкомпенсації, без ускладнень або з ускладненнями: діабетична периферична ангіопатія нижніх кінцівок; діабетична ретинопатія I, II стадії; діабетична нефропатія I – IV стадії; діабетична полінейропатія 2. Знижена толерантність до глюкози	Цукровий діабет 1-го та 2-го типів в стадії декомпенсації з наступними ускладненнями (Е 10, Е 11): кетоз (Е 10.1, Е 11.1); діабетична нефропатія V стадія (Е 10.2+ N 08.3, Е 11.2+ N 08.3); тяжкі порушення кровообігу нижніх кінцівок, в тому числі гангрена (Е 10.5 + R 02, Е 11.5 + R 02)			+				
					+					+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Шлунково-кишкова реабілітація										
38	К 25, К 26, К 27, К 80, К 83, К 76, К 86, D 12, D 13, C 17, C 18, C 19, К 22, К 56, К 66	Підгострий період після оперативних втручань на органах травлення	1. Стани після дренажних шлункових операцій у поєднанні з різними видами ваготомії. 2. Стани після селективної проксимальної ваготомії при наявності астенічного синдрому, синдрому “малого шлунка”, демпінг та гіпоглікемічного синдрому легкого та середнього ступеня. 3. Стани після резекції шлунка. 4. Стан після холецистектомії та реконструктивних операцій на жовчних шляхах. 5. Стани після видалення гемангіом та кіст печінки. 6. Стани після операцій на підшлунковій залозі з	1. Загальні протипоказання, що виключають направлення хворих у санаторій. 2. Післяопераційні ускладнення: незагоєна післяопераційна рана; лігатурні свищі; свищі шлунково- кишкового тракту; гострий панкреатит, холангіт; синдром привідної петлі; демпінг та гіпоглікемічний синдром тяжкого ступеня; атонія культі шлунка; тяжка форма			+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			приводу гострого панкреатиту, панкреонекрозу і кіст підшлункової залози. 7. Стани після оперативних втручань на тонкому та товстому кишківнику з приводу доброякісних новоутворень. 8. Стани після оперативних втручань на тонкому та товстому кишківнику з приводу злоякісних новоутворень, які не супроводжуються формуванням колостоми та без метастазів. 9. Стани після проведення ендоскопічних операцій на стравоході, шлунку, 12-палій кишці (ендоскопічні резекції, підслизова десекція, аргоноплазмозна абляція, ендоскопічний гемостаз) з приводу виразок	постваготомічної діареї; виражене порушення харчування (виснаження); порушення прохідності панкреатичного протоку, стеноз холедоха, наявність каменів у холедоху, стенозуючий папіліт. 3. Ускладнення з боку серцевої і легеневої систем, що розвинулися в ранньому післяопераційному періоді і не зникли до моменту виписки з хірургічного стаціонару. 4. Захворювання органів травлення: ентероколіти з							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			доброякісних пухлин. 10. Спайкова хвороба органів черевної порожнини (стани після операцій з непрохідністю кишківника підгострий період	виразним порушенням харчування (виснаженням); хронічна дизентерія, неспецифічний виразковий коліт, хронічний коліт з поширенням виразковим або ерозійним процесом у прямій або сигмовидній кишці, а також геморой, що кровоточить, поліп або поліпоз кишківника; залишкові явища вірусного гепатиту (наявність больового, диспептичного, астеничного синдромів) зі значними відхиленнями функціональних проб							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				печінки; хронічний (прогресуючий) гепатит будь-якої етіології; цироз печінки; порушення прохідності панкреатичного протоку							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Сечостатева реабілітація										
40	N 99.8, N 20 – N 23, D 29.1 – D 29.4, D 29.7	Підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії)	1. Підгострий період після хірургічного, в тому числі ударно-хвильової літотрипсії, малоінвазивного та інструментального втручання на органах сечостатевої системи. 2. Підгострий період після оперативного та інструментального втручання, при сечокам'яній хворобі. 3. Підгострий період після хірургічного, в тому числі малоінвазивного втручання з приводу доброякісних новоутворень сечостатевих органів (доброякісна гіперплазія простати не вище II ступеня)	1. Хронічні захворювання нирок з нирковою недостатністю II – III ст, високим артеріальним тиском (понад 180/100 – 110) або нейроретиніт. 2. Нефросклероз з симптомами ниркової недостатності. 3. Гідронефроз, полікістоз, ускладнений нирковою недостатністю. 4. Амілоїдоз нирок з набряками і азотемією. 5. Макроскопічна гематурія будь-якого походження. 6. Всі урологічні			+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				хвороби в гострій стадії та хронічні в стадії загострення. 7. Стриктур уретри. 8. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози ІІІ стадії. 9. Злоякісні пухлини, специфічні запальні захворювання без попередньої санації							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	N 85.0– N 85.2, N 70, D 27, N 99.4, N 73.4, N 73.6, N 73.8	Підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах	1. Підгострий період після гістеректомії (надпихової ампутації матки з придатками або без придатків, екстирпації матки з приводу лейоміоми матки, аденоміозу, гіперплазії ендометрію тощо. 2. Підгострий період після оперативних втручань на придатках матки (яєчників, маткових труб) шляхом лапароскопії або лапаротомії. 3. Підгострий період після видалення новоутворень яєчників (доброякісних пухлин, кістозних утворень, роз'єднання спайок та зрощень з матковими трубами тощо)	1. Злоякісні новоутворення і підозра на їх наявність. 2. Захворювання, які супроводжуються матковими кровотечами (гіперплазія ендометрію, поліпи ендометрію тощо). 3. Кровоточива ерозія шийки матки, або підозра на дисплазію шийки матки, яка виявлена шляхом кольпоскопії та цитоморфологічного дослідження. 4. Кісти та кістоми яєчників. 5. Симптомна лейоміома матки у поєднанні з аденоміозом різного ступеня.			+			+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Підгострий період після оперативного втручання з приводу пельвіоперитониту без підвищення температури	6. Новоутворення молочних залоз (фіброаденоми, очаговий фіброаденоз, гострий або дифузний мастит тощо). 7. Міхурово-кишково-піхвенні нориці. 8. Передракові захворювання жіночих статевих органів, а також стан після операцій з приводу злоякісних пухлини							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Зовнішні причини захворюваності і смертності										
43	Y 36.0	Ушкодження унаслідок воєнних дій, спричинені вибухом військово-морської зброї	Ранній післягоспітальний період лікування вогнепальних та невогнепальних поранень. Наявність ізольованих чи множинних патологічних установок та контрактур суглобів кінцівок	Наявність пошкоджень головного чи спинного мозку, хребта, ран, трофічних виразок після опіків, порушень функції органів малого тазу, накладених апаратів зовнішньої фіксації, станів, що потребують хірургічної допомоги (хірургічної обробки та перев'язувань). Наявність парезів та паралічів окремих м'язів і груп м'язів кінцівок та тулуба із значним неврологічним дефіцитом, що унеможливає	+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	У 36.1	Ушкодження унаслідок воєнних дій, спричинені руйнуванням літака		самостійне пересування та самообслуговування	+	+	+	+		+	
45	У 36.2	Військові операції, що викликали ушкодження іншими видами вибухів чи уламками			+	+	+	+		+	
46	У 36.3	Ушкодження внаслідок воєнних дій, спричинені вогнепальною зброєю та іншими видами звичайного озброєння			+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	У 36.4	Ушкодження внаслідок воєнних дій, спричинені вогнепальною зброєю та іншими видами звичайного озброєння			+	+	+	+		+	
48	У 36.8	Ушкодження, отримані внаслідок бойових операцій після припинення воєнних дій			+	+	+	+		+	
49	У 36.9	Ушкодження, спричинені не уточненими воєнними діями			+	+	+	+		+	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Медико-психологічна реабілітація										
51	F 43, F 50, F 51, F 45, F 48, Z 73.0	Порушення адаптації, розлади, пов'язані із споживанням їжі, неорганічні розлади сну, соматоформні розлади, неврастенія, перевтома, пов'язана зі складними умовами життя	1. Порушення адаптації. 2. Розлади пов'язані із споживанням їжі. 3. Неорганічні розлади сну. 4. Соматоформні розлади. 5. Неврастенія. 6. Перевтома	1. Розлади психіки і поведінки психотичного рівня. 2. Гострий період неспокійних психічних розладів та розладів поведінки. 3. Олігофренія. 4. Порушення психіки (епілепсія, психоневрози, психопатії, розумова відсталість), які потребують індивідуальних умов догляду та лікування	+	+	+	+	+	+	+

Командувач Медичних сил Збройних Сил України
генерал-майор медичної служби

Ігор ХОМЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

09 грудня 2015 року № 703

(у редакції наказу Міністерства оборони України

27 серпня 2020 року № 297)



ПЕРЕЛКИ

медичних протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в
санаторно-курортних закладах Збройних Сил України

I. Перелік загальних протипоказань

1. Захворювання в гострій та підгострій стадії, в тому числі гострі інфекційні захворювання до закінчення періоду ізоляції.
2. Захворювання, що передаються статевим шляхом.
3. Хронічні захворювання у стадії загострення.
4. Бактеріоносійство інфекційних захворювань.
5. Заразні хвороби шкіри та очей.
6. Паразитарні захворювання.
7. Захворювання, що супроводжуються стійким больовим синдромом, що потребують постійного приймання наркотичних засобів та психотропних речовин.
8. Усі форми туберкульозу в активній стадії.
9. Ревматичний ендоміокардит в активній фазі.

10. Міокардити з тяжким перебігом.

11. Атеросклероз судин нижніх кінцівок, облітеруючий ендартеріт з декомпенсацією, генералізацією перебігу, наявністю виразок та гангрен.

12. Тромбоемболічна хвороба.

13. Серцева недостатність, вища за II A стадію.

14. Кардіосклероз з порушенням серцевого ритму: часта (понад 5 за хвилину) політопна (з двох або більше місць) екстрасистолія; фібриляція передсердь із серцевою недостатністю I стадії і вище; повна атріовентрикулярна блокада; повна блокада правої і лівої ніжок пучка Гіса; двопучкова блокада у поєднанні з іншими порушеннями ритму; часті пароксизми тахікардії; штучний водій ритму із збереженням складних порушень ритму.

15. Ішемічна хвороба серця:

1) гострий інфаркт міокарда;

2) напади стенокардії внаслідок звичайних навантажень (III ФК) із серцевою недостатністю, вищою за I стадію, з порушенням ритму;

3) часті напади стенокардії напруги та спокою (IV ФК) або лівошлуночкова недостатність (серцева астма).

16. Гіпертонічна хвороба злоякісного перебігу, гіпертонічна хвороба III стадії з недавно перенесеним інфарктом, інсультом, із серцевою недостатністю, вищою за II A стадію, із прогностично несприятливими порушеннями ритму й провідності, порушенням азотвидільної функції нирок.

17. Новоутворення неуточненого характеру (при відсутності письмового підтвердження в медичній документації хворого про те, що пацієнт (законний представник пацієнта) попереджений про можливі ризики, пов'язані з ускладненнями захворювання у зв'язку з санаторно-курортним лікуванням).

18. Злоякісні новоутворення.

19. Хвороби крові в стадії загострення.

20. Епілепсія.

21. Психічні розлади і розлади поведінки в стані загострення або нестійкої ремісії, в тому числі, що несуть загрозу для пацієнта та оточуючих.

22. Всі форми наркоманії і хронічного алкоголізму.

23. Кахексія будь-якого походження.

24. Невиліковні прогресуючі захворювання та стани, що потребують надання паліативної медичної допомоги.

25. Вагітність у всі терміни:

1) на бальнеологічні та грязьові курорти з приводу гінекологічних захворювань;

2) для лікування радоновими ваннами екстрагенітальних захворювань;

3) на кліматичні курорти, починаючи з 26 тижня (крім спеціалізованих відділень для вагітних жінок).

II. Перелік протипоказань відповідно до профілю санаторно-курортних закладів

1. Центральний військовий клінічний санаторій “Хмільник”:

1) тяжкі форми ураження кісток, суглобів із значним відокремленням, тяжкими загальними явищами (гектична температура, різке виснаження) або амілоїдозом внутрішніх органів;

2) поліартрити з прогресуючим деформуючим процесом у суглобах, з анкілозами, контрактурами з незворотними змінами в суглобах і втратою здатності до самообслуговування;

3) хронічні остеомієліти за наявності великих секвестрів або великого стороннього предмета в остеомієлітному вогнищі;

4) септичні форми ревматоїдного поліартрити, ревматоїдний артрит із системними ураженнями (вісцеритами);

5) серцева недостатність, вища за I стадію.

2. Центр медичної реабілітації та санаторного лікування “Трускавецький”:

- 1) рецидивні тромбофлебіти;
- 2) аневризма серця і аорти;
- 3) рубцеве звуження стравоходу, воротаря дванадцятипалої кишки і кишок з порушенням прохідності; стриктура загального жовчного протоку і протоку жовчного міхура;
- 4) ентероколіт з вираженим порушенням харчування, виснаженням;
- 5) хронічна дизентерія, неспецифічні виразкові коліти з великими виразковими або ерозійним процесами в прямій і сигмовидній кишках, виявленими під час ректоскопії, а також кровоточивий геморой, поліпоз кишківника;
- 6) хвороби, пов'язані з сечовипусканням, звуження сечового каналу – стриктура уретри;
- 7) хронічні хвороби нирок (хронічний гломерулонефрит, хронічний пієлонефрит) з виразними явищами ниркової недостатності, з високим артеріальним тиском;
- 8) макроскопічна гематурія будь-якого походження;
- 9) полікістоз і кісти нирок (множинні, великі солітарні) з явищами ниркової недостатності;
- 10) нефротичний синдром з вираженими набряками і ознаками хронічної ниркової недостатності;
- 11) хвороби нирок і сечових шляхів, що супроводжуються гідронефрозом II стадії і вище;
- 12) тиреотоксикоз тяжкого ступеня.

3. Центральний військовий санаторій “Приморський”:

- 1) травми та захворювання дихальної системи, що супроводжується

утворенням плеврального випоту та виникненням спонтанного пневмотораксу;

2) виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки ускладнена;
3) цукровий діабет середнього та важкого ступенів;
4) аміотрофічний бічний склероз (виражені клінічні ознаки);
5) сирингобульбія, сирингомієлія, паркінсонізм та інші дегенеративні захворювання, розсіяний склероз та інші демієлінізуючі захворювання нервової системи при проградієнтній течії, з руховими та тазовими порушеннями і деменцією;

6) наслідки травм та захворювань спинного мозку:
повне пошкодження спинного мозку;
травматична кахексія;
гостра або хронічна затримка сечі, що вимагає катетеризацію сечового міхура;

хронічний остеомієліт, що вимагає оперативного втручання;
виражені порушення функції нирок, уросепсис;

7) наслідки травм та захворювань головного мозку зі значними порушеннями рухових функцій, епісіндромом з розвитком нападів частіше двох разів у рік, деменцією з порушенням самообслуговування, самостійного пересування й мови;

8) захворювання нирок із гідронефрозом II стадії і вище, коралоподібні рецидивні камені нирок;

9) хронічні захворювання нирок із виразними явищами хронічної ниркової недостатності;

10) гіперплазія передміхурової залози II та III стадії;

11) нетримання сечі.

4. Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону:

- 1) захворювання нирок із гідронефрозом II стадії і вище;
- 2) хронічні захворювання нирок із виразними явищами хронічної ниркової недостатності.

5. Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону:

- 1) травми та захворювання дихальної системи, що супроводжується утворенням плеврального випоту та виникненням спонтанного пневмотораксу;
- 2) виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки ускладнена;
- 3) цукровий діабет середнього та важкого ступенів;
- 4) аміотрофічний бічний склероз (виражені клінічні ознаки);
- 5) сирингобульбія, сирингомієлія, паркінсонізм та інші дегенеративні захворювання, розсіяний склероз та інші демієлінізуючі захворювання нервової системи при проградієнтній течії, з руховими та тазовими порушеннями і деменцією;
- 6) наслідки травм та захворювань спинного мозку:
 - повне пошкодження спинного мозку;
 - травматична кахексія;
 - гостра або хронічна затримка сечі, що вимагає катетеризацію сечового міхура;
 - хронічний остеомієліт, що вимагає оперативного втручання;
 - виражені порушення функції нирок, уросепсис;
- 7) наслідки травм та захворювань головного мозку зі значними порушеннями рухових функцій, епісиндромом з розвитком нападів частіше двох разів у рік, деменцією з порушенням самообслуговування, самостійного пересування й мови;
- 8) захворювання нирок із гідронефрозом II стадії і вище, коралоподібні рецидивні камені нирок;

9) хронічні захворювання нирок із виразними явищами хронічної ниркової недостатності;

10) гіперплазія передміхурової залози II та III стадії;

11) нетримання сечі.

Командувач Медичних сил Збройних Сил України
генерал-майор медичної служби



Ігор ХОМЕНКО